

УДК 599:502.7 (477.5)

**Лиманский С. В., Кондратенко А. В.**  
**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРИОФАУНЫ**  
**ЗАПОВЕДНИКА «МЕЛОВАЯ ФЛОРА»**

**Введение**

Заповедник «Меловая флора» площадью 1134 га организован в 1988 году и является отделением Украинского степного природного заповедника НАН Украины.

Заповедная территория расположена на правом, высоком гористом берегу р. Северский Донец, имеющем обширные меловые и известняковые обнажения. Здесь представлены биотопы с различными типами растительных сообществ, в том числе, сосновые боры, байрачные дубравы, участки богатой, разнотравно-типчаково-ковыльной степи, кретофильной растительности, искусственные лесопосадки, участки рудеральной, луговой, водной и околородной растительности. Характерен овражно-балочный рельеф, почвенно-гидрологические условия и микроклимат, к которым тяготеют отдельные виды млекопитающих.

**Методики исследования**

Комплексные исследования фауны млекопитающих заповедника специалистами-териологами практически не проводились, поэтому приведенные ниже данные о видовом составе, биотопическом распределении и численности млекопитающих являются результатом, в основном личных наблюдений, и немногочисленных отчетов других зоологов, посещавших заповедник в разные годы. При изучении териофауны заповедника нами проводились визуальные наблюдения за животными, тропление и изучение следов на снегу, влажном или рыхлом грунте, отлов мелких млекопитающих методом ловушко-линий (с применением плашек Геро), поиск и учет жилых нор и т. п.

**Аннотированный список фауны млекопитающих**

Териофауна заповедника остается недостаточно изученной. На данный момент известно обитание 37 видов млекопитающих, относящихся к 16 семействам 5 отрядов. Систематика и латинские названия приводятся согласно последней сводке по млекопитающим Украины [1].

**Отряд *Soriciformes (Insectivora auct.)*.** Достоверно известно обитание 4 видов 3-х семейств.

Сем. *Erinaceidae* представлено 1 видом – еж белогрудый (*Erinaceus concolor*) – обычный, регулярно встречающийся в низинных частях заповедника вид. Тяготеет к близлежащим населенным пунктам.

Сем. *Talpidae*. Единственный представитель – европейский крот (*Talpa europaea*) – малочисленный, редко отмечаемый вид, придержива-

ется лиственных лесов. Следы жизнедеятельности (кротовины) отмечены в урочищах "Широкое", "Байрак" и в тополельниках вблизи турбаз.

Сем. Soricidae представлено двумя видами, бурозубкой обыкновенной (*Sorex araneus*) и бурозубкой малой (*S. minutus*). Оба вида немногочисленны, но часто встречаются в зарослях кустарников.

Помимо вышеуказанных, возможны находки еще некоторых видов. Вероятно, в 70-х годах из региона исчезла выхухоль (*Desmana moschata*), по озерам-старичам и в реке Северский Донец возможны находки обыкновенной (*Neomys fodiens*) и малой кутор (*Neomys anomalus*), а на степных участках, малой белозубки (*Crocidura suaveolens*).

**Отряд Vespertilioniformes (Chiroptera auct.)** до сего времени остается неизученным. Исходя из известных для Донецкой, смежных Харьковской и Луганской областей, списков видов хироптерофауны, нами предполагается обитание в заповеднике следующих видов летучих мышей сем. Vespertilionidae: водяная ночница (*Myotis daubentonii*), прудовая ночница (*Myotis dasycneme*), усатая ночница (*Myotis mystacinus*), ушан обыкновенный (*Plecotus auritus*), рыжая вечерница (*Nyctalus noctula*), нетопырь лесной (*Pipistrellus nathusii*), нетопырь-карлик (*P. pipistrellus*), поздний кожан (*Eptesicus serotinus*).

**Отряд Caniformes (Carnivora auct.)** представлен 9 видами 2-х семейств.

Сем. Canidae. На территории заповедника обитают представители 3-х видов данного семейства. Следы 1–2 особей волка (*Canis lupus*) регулярно встречаются зимой и ранней весной. В марте 1999 г. обнаружены следы пары волков и остатки добытой ими косули в ур. "Три яра". Лисица (*Vulpes vulpes*) является самым многочисленным животным среди хищных млекопитающих. Норы данного вида располагаются практически в каждом урочище. По данным учета в 2000 году, на заповедной территории обитают 20 особей лисицы. Енотовидная собака (*Nyctereutes procyonoides*) – немногочисленный, но регулярно встречающийся вид. В "Глубоком яру", в сумерках отмечено две особи данного вида.

Сем. Mustelidae представлено 6 видами, среди которых только барсук (*Meles meles*) является обычным видом. На территории заповедника обнаружены три поселения барсука, но только два из них являются жилыми. Размножение этого вида ежегодно отмечается в ур. "Широкое". Малочисленными, но регулярно встречающимися видами являются: куница каменная (*Martes foina*), ласка (*Mustela nivalis*), горноста́й (*M. erminea*), светлый хорь (*M. eversmani*). Вдоль реки и по прибрежным биотопам изредка встречается американская норка (*M. vison*).

**Отряд Cerviformes (Artiodactyla auct.)**. На заповедной территории встречаются представители 4-х видов, 2-х семейств данного отряда.

Сем. Suidae представлено единственным видом – дикий кабан (*Sus scrofa*). Животные часто встречаются по лесным участкам заповедника. Во время сезона охоты кабан использует заповедные урочища как убежища, и его численность тогда увеличивается до 20 особей.

Сем. Cervidae включает представителей 3-х видов. Лось (*Alces alces*) – ранее обычный, а в последнее время редкий, нерегулярно отмечаемый вид. До 1993 года регистрировались до 3-х особей одновременно, в

последующие годы встречи лося стали редкими. Чаще всего присутствие лося отмечается по следам. Визуально 2 животных были отмечены 3 марта 2001 года, вблизи урочища "Байрак". Обычно посещает верхнюю, лесистую часть заповедника. благородный олень (*Cervus elaphus*) изредка заходит из лесных массивов, расположенных на левом берегу р. Северский Донец. В 1995 году были отмечены 3 особи данного вида в урочище "Марьиная гора". Косуля (*Capreolus capreolus*) регулярно встречается небольшими группами до 4-5 особей. Численность колеблется по годам от 19 особей (1998 г.) до 8 (2000 г.).

**Отряд Leporiformes (Duplicidentata auct.).** Заяц-русак (*Lepus europaeus*) в "Меловой флоре" является одним из наиболее типичных видов млекопитающих. Наиболее часто встречается по степным участкам и лесным прогалинам. Численность составляет не менее 30 особей.

**Отряд Muriformes (Rodentia auct.)** включает представителей 19 видов 8 семейств.

Сем. Sciuridae представлено 3 видами 3-х родов. Белка (*Sciurus vulgaris*) изредка встречается в сосновых борах. Визуально отмечалась в урочищах "Сосновое", "Глубокое", где в 1994 году было найдено старое гнездо (гайно) на высоте около 6 метров. Крапчатый суслик (*Spermophilus suslicus*) начал регулярно отмечаться с 1997 года в верховьях урочища "Кучугуры". Выпущенные в окрестностях с. Пискуновка степные сурки (*Marmota bobac*) погибли в течение 1995-96 годов, одна особь байбака прожила на окраине заповедника в урочище "Беловодка" до 1997 г.

Сем. Castoridae. В пределах заповедника, по р. Северский Донец отмечены три места обитания бобра (*Castor fiber*). Чаще встречаются характерные погрызы и поваленные деревья, реже можно наблюдать и самого бобра. Предполагаемая численность бобра в заповеднике составляет не менее 6 взрослых особей.

Сем. Myocastoridae. Нутрия (*Myocastor coypus*) изредка встречается на реке и по озерам в окрестностях заповедника.

Сем. Spalacidae представлено обыкновенным слепышом (*Spalax microphthalmus*), который является многочисленным в заповеднике. Следы его жизнедеятельности (слепышовины) встречаются как на степных участках, так и в байраках.

Сем. Muroidae. Лесная соня (*Dryomys nitedula*) обычный, но не многочисленный вид в заповеднике. Встречается, как в байрачных дубравах, так и по сосновым борам. Численность в среднем составляет 0,9 особи на 100 ловушко-суток (л/с).

Сем. Muridae представлено 7 видами 5 родов. Домовая мышь (*Mus musculus*) и серая крыса (*Rattus norvegicus*) обычные виды в заповеднике, однако придерживаются преимущественно населенных пунктов. Численность домовой мыши в среднем составляет 0,9 особи на 100 л/с. Полевая мышь (*Apodemus agrarius*) довольно многочисленный вид, населяющий прибрежные пойменные биотопы. Численность данного вида в искусственных лесонасаждениях на берегу реки (по данным учетов в 1999 году) составляет 13,6 особи на 100 л/с. Гнезда мыши-малютки (*Micromys minutus*) изредка встречаются на прибрежных лугах и в зарослях околородной растительности. Род *Sylvaemus* представлен 3 видами, среди которых наиболее обычным является желтогорлая мышь (*S. tauricus*). Ее числен-

ность колеблется от 0,9 (вязовые насаждения в районе турбаз) до 20,9 (байрачная дубрава) особей на 100 л/с. Малая (*S. uralensis*) и лесная (*S. sylvaticus*) мыши встречаются во всех биотопах с наличием древесно-кустарниковой растительности. Их средняя численность составляет 1,8 и 3,6 особей на 100 л/с, соответственно.

Сем. Arvicolidae включает представителей 4-х видов, 4-х родов. В лесных биотопах довольно многочисленным видом является рыжая полевка (*Myodes glareolus*), с численностью от 0,9 до 5,5 особей на 100 л/с. Степные и луговые участки населяет восточноевропейская полевка (*Microtus rossiaemeridionalis*). На р. Северский Донец и по прибрежным водоемам встречаются водяная полевка (*Arvicola amphibius*) и ондатра (*Ondatra zibethicus*).

Сем. Cricetidae. Единственный представитель семейства – серый хомячок (*Cricetulus migratorius*) изредка встречается на участках целинной степи.

Помимо указанных видов возможны находки степной мышовки (*Sicista subtilis*) и мышовки Штранди (*Sicista strandi*), подземной полевки (*Terricola subterraneus*) и курганчиковой мыши (*Mus spicilegus*).

Раритетное ядро териофауны заповедника представлено тремя краснокнижными видами семейства куньи (барсук — II кат., горностай — IV кат., степной хорь — III кат.) [2], имеющими низкую, нестабильную численность и 4 регионально редкими видами, которые объединяют крапчатого суслика, серого хомячка, крота и лося, и нуждаются в охране на региональном уровне.

В целом, предложенный список видов млекопитающих заповедника еще не полон, но можно с уверенностью утверждать, что фауна млекопитающих заповедника представляет более 50 % видового богатства териофауны Восточной Украины.

### Литература

1. Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. – Київ, 1999. – 222 с. 2. Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. М. М. Щербака. – Київ: УЕ, 1994. – 457 с.

### Summary

**State-of-the-art of the teriofauna of the reserve "Melovaya flora". — Limansky S. V., Kondratenko A. V.** — General information on the reserve "Melovaya flora" is given. Mainly original data on the reserve teriofauna are given in the annotated list, which includes 6 orders (Soriciformes, Vespertilioniformes, Caniformes, Cerviformes, Leporiformes, and Muriformes), 16 families and 37 species.