

Распространение и численность крота европейского в НПШ «Святые Горы»

Евгений Скубак

Национальный природный парк «Святые Горы»; npp.svgor@yandex.ru

С середины XX века по 1999 г. указаний на встречи крота в пойме Северского Донца не было, вид известен только из Великоанадольского лесничества, где был акклиматизирован в 1953 г. На территории парка крот был повторно найден летом 1999 г. в нагорных дубравах правого берега р. Северский Донец. В 2006-2012 гг. были обследованы все известные на тот момент в НПШ «Святые Горы» местообитания крота, а также перспективные биотопы на территории парка. Крот не только сохранился во всех известных пунктах, но и стал в большинстве мест обычным видом. Его ареал остается фрагментированным, очаговым. Наибольшей плотности популяция крота достигает в пойменных дубравах и тополельниках (в среднем 17 ходов/км). Вблизи воды, где концентрируются ходы, ведущие на водопой, численность крота может достигать до 40 ходов/км. На удаленных от воды участках численность порядка 9–12 ходов/км. Это примерно соответствует численности крота в Великоанадольском лесу. Минимальной остается численность крота в нагорных дубравах Теплинского лесничества в правобережной части Парка. Он встречается здесь лишь спорадически, в отдельных балках. До 2009 г. численность крота на территории Парка была довольно низкой, и не отличалась от данных из литературы за предыдущие годы. Резкий всплеск численности произошел в 2010 г., вероятно, из-за благоприятных климатических условий.

Встреча перевязки (*Vormela peregusna*) на севере Донецкой области

Евгений Скубак

Национальный природный парк «Святые Горы»; npp.svgor@yandex.ru

Перевязка была известна на территории Донецкой области только со степных районов юга области. На окраине г. Славянска в частном секторе 25 июля 2010 г. встречена молодая перевязка. Зверь отловлен собакой возле клетки с перепелами. После передержки в неволе перевязка сбежала в р-не с. Пришиб Славянского района Донецкой обл. Село окружено степными участками, и биотопы здесь в целом подходят для обитания этого вида. Помимо этой находки, имеется устное сообщение М. О. Высочина о находке этого вида в окр. г. Краматорск. Обе находки свидетельствуют как о расширении ареала перевязки на северо-запад, так и об его возросшей синантропизации.