

Возрождение популяции речного бобра (*Castor fiber* L.) на Левобережной Украине

В. А. Токарский*, А. М. Волох**, Н. В. Токарская*

*Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; v.tokarsky@mail.ru; **Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитополь; volokh50@ukr.net

Восстановлению ареала бобра в Левобережной Украине во многом способствовали работы по его расселению, которые проводились в Киевской (1950, 1964), Черниговской (1964), Днепропетровской (1972), Полтавской (1972–1976) и Луганской (1971) областях. Благодаря благоприятным экологическим условиям, зверьки быстро заселили водоёмы Полесья. Несколько дольше бобровые популяции формировались в Лесостепной и Степной зонах.

Наиболее существенных результатов удалось достичь в Полтавской области, где животных выпускали в 4-местах в бассейнах Ворсклы (рр. Добрешин, Мерла) и Псла (р. Грунь-Ташань). По Ворскле бобры проникли в Сумскую область, где в 1982 г. были обнаружены в В.-Писаревском районе между сёлами Дробяньское и Новая Рябина. По данным Е.В. Скоробогатова и Т. А. Атемасова, по р. Мерле зверьки из Полтавщины проникли на территорию Краснокутского района Харьковской области, где в 1991–1992 гг. между селами Коопранское и с. Городнее учтено 24 поселения. В 1994 г. бобры появились в Золочевском районе – в верховье р. Мерлы возле с. Рясного. За 12 лет с момента интродукции они заселили 93 км поймы этой речки. В 1998 г. первые бобровые поселения возникли на р. Уде ниже г. Харькова, на расстоянии более 300 км от мест их выпуска.

К 2000 г. бобры пересекли границу между Днепровским и Донскими водоразделами. К настоящему времени они заселили пойму Северского Донца и его притоки. На территории Харьковской области бобровые поселения встречаются в Великобурлукском и Двуречанском районах (заселено ~ 400 км). В Донецкой области зверьки освоили 88 км побережья речек Бахмут и Жеребец, в Луганской области – 131 км р. Красной (от устья вверх по течению) и более чем 250 км р. Айдара. В пределах Новоайдарского района на этой реке обитало около 30 семей бобра. Из них 8 располагалось в старом русле Айдара в урочище «Терновая», а 9 – в урочище «Пристены». На участке от с. Денежникового до моста в с. Спесваковке было зарегистрировано 5 семей и от с. Спесваковки до турбазы в с. Штормово – ещё 7.

В 2007 г. учтено: в Донецкой области – 79, в Луганской – 1241, в Полтавской – 2696 и в Харьковской – 308 бобров. Таким образом, к началу XXI ст. в Левобережной Украине ареал бобра был полностью восстановлен, а его возобновлённые популяции успешно развиваются.