

Хижі ссавці регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський»

Андрій Сагайдак

Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»; *RLPmegrich@i.ua*

Інвентаризація фауни є одним із завдань установ природно-заповідного фонду. Хижі ссавці (Carnivora) у регіональному ландшафтному парку «Міжрічинський» залишаються мало вивченою групою. Відтак, наводимо короткі відомості щодо видового складу та чисельності цієї групи тварин.

Великі хижі (Felidae та Canidae). Рись євразійську (*Felis lynx* (L., 1758)) вперше відмічено на території Парку 2003 р. З того часу її чисельність зростає і коливається у межах 8–10 особин. На території Парку кілька років поспіль розмножувалися 2–3 самиці. Чисельність вовка є нестабільною, проте він завжди залишається звичайним: тут у різні роки розмножувалися 2–4 пари вовка (*Canis lupus* L., 1758). Звичайним у Парку видом є лисиця руда (*Vulpes vulpes* (L., 1758)). Єнот уссурійський (*Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834)) у вологих біотопах є чисельним видом, динаміка якого є стабільною.

Дрібні Мустелові (Mustela, Neovison). Горностаї (*Mustela erminea* L., 1758) – чисельність потребує уточнення. За попередніми даними є рідкісним видом. В подальшому можна очікувати зниження чисельності через погіршення кормової бази. Ласка (*Mustela nivalis* L., 1766) – спеціальні обліки виду не здійснювалися. На території Парку ласка є нечисленною. Тхір чорний (*Mustela putorius* L., 1758) на території Парку є рідкісним видом, чисельність якого значно знизилася протягом останніх десятиліть та залишається стабільно низькою. Візон річковий, або норка американська (*Neovison vison* (Schreber, 1777)) поширена практично на всіх водоймах Парку, незалежно від їх типу. У Парку вид є звичайним, а на окремих водоймах – численним.

Великі Мустелові (Lutra, Meles, Martes). Обліки куниць в Парку не проводили, але відомо, що куниця лісова (*Martes martes* (L., 1758)) є звичайним видом, а куниця кам'яна (*Martes foina* (Erxleben, 1777)) – рідкісною. Наразі у Парку відомо 8 поселень борсука європейського (*Meles meles* (L., 1758)), проте кількість їх значно більша, оцінена у 60 особин. Орієнтовна чисельність видри річкової (*Lutra lutra* (L., 1758)) становить 25–30 особин і є стабільною, проте надмірна рекреація, збіднення рибних запасів та погіршення гідрологічного режиму території можуть спровокувати зниження її чисельності.

Сучасний видовий склад хижих ссавців Парку налічує 12 видів, з яких 8 належать до родини Мустелових, 3 – до родини псових, родина Котових представлена одним видом. Протягом ХХ ст. з території Парку зникли ведмідь бурий та норка європейська, натомість фауна хижих поповнилася двома інтродуцентами – єнотом уссурійським та візоном річковим.