

До фауни кажанів РЛП «Міжрічинський»

Володимир Тищенко, Андрій Сагайдак

НУБіП України (Київ); kazhan@online.ua

Подано попередній огляд деяких результатів детекторних обліків рукокрилих на території РЛП «Міжрічинський» (Чернігівська обл.) у літні місяці 2010–2012 рр. Матеріал зібрано під час п'яти обліків кажанів з автомобіля за програмою *iBats* (Indicator Bats Program) та окремих піших маршрутних детекторних обліків. Загальна протяжність маршрутів склала 180 км, маршрути охоплювали різні ландшафти парку.

Вечірниця дозріра (*Nyctalus noctula*) є звичайним видом регіону, здавна відомим для Чернігівщини (Шешурак, Кедров, 1998). Відомі випадки зимівель вечірниць у будівлях населених пунктів області. Вид регулярно відмічався під час осінніх міграцій на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» південніше території Парку у 1980–90-х рр. (Полуда, Загороднюк, 2001). Вид є звичайним на більшій частині території Парку, численний у заплаві Десни, регулярно відмічається на узліссях вздовж боліт та на військових полігонах.

Нетопир лісовий (*Pipistrellus nathusii*) є нечисленним видом, відомим для Чернігівського Полісся лише за загальними вказівками у деяких зведеннях. Вид є типовим дендрофілом, мігрантом; надає перевагу рідколіссям. Нетопир звичайний (*P. pipistrellus*) та нетопир-пігмей (*P. pygmaeus*) є звичайними напівсинантропними видами, проте їх статус видів на території Парку потребує з'ясування. Нетопир звичайний здавна відомий для території Козелецького р-ну (Абеленцев, Попов, 1956). *P. pipistrellus* частіше за інші види кажанів реєструвався на орнітостаціонарі «Лебедівка» у 1988–1990 рр. (Полуда, Загороднюк, 2001), проте на той час види *P. pipistrellus* та *P. pygmaeus* не розрізняли, і вказівки можуть стосуватися будь-якого з них. Нетопир білосмугий (*P. kuhlii*) є нечисленним напівсинантропним видом території парку. Зустрічається у різних біотопах неподалік від населених пунктів.

Лилик двоколірний (*Vespertilio murinus*) є нечисленним спорадично поширеним на території Парку видом. Кормові біотопи приурочені до відкритих та напіввідкритих ландшафтів: ділянок узлісь, лук, доріг, лісових культур. Кажан пізній (*Eptesicus serotinus*) є звичайним осілим синантропним видом, одним з найчисленніших у населених пунктах на території Парку, здавна відомий у складі фауни Чернігівщини. Цей вид неодноразово реєстрували УЗ-детектором та візуально у різних районах Парку. Нічниця водяна (*Myotis daubentonii*) є звичайним видом заплави Десни, прибережних ділянок Київського водосховища, затоплених ділянок боліт. Знахідки вечірниці малої та широковуха європейського відомі з суміжних районів Київщини, можливість існування цих двох видів на території Парку потребує підтвердження.