

Безродный С. В. Распространение сонь (Rodentia, Gliridae) на Украине // Вестник зоологии. — 1991. — № 3. — С. 45–50. (Розпізнання тексту та виготовлення pdf — Ігор Загороднюк)

Вестник зоологии, 1991, № 3: 45–50

УДК 599.323.2 (477)

**С. В. Безродный**

## РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОНЬ (RODENTIA, GLIRIDAE) НА УКРАИНЕ

Наиболее полная картина современного распространения сонь в европейской части СССР представлена в статье Г. Н. Лихачева (1972). В указанной работе обобщен весь имеющийся на то время материал по распространению сонь, основанный на коллекциях зоологических музеев страны, а также на использованных литературных данных.

До настоящего времени на Украине не было работ, в которых представлялась бы полная и реальная картина изучаемого нами вопроса. Исключение составляют отдельные публикации Л. И. Белик, С. Л. Самарского, В. В. Новикова (1984) и Л. И. Белик (1989), однако в них охватывается лишь узкий регион Среднего Приднепровья.

Целью нашей работы было обобщение всего имеющегося материала, включая собственные исследования и сведения, полученные от областных санэпидемстанций для составления видовых карт, а в дальнейшем — и кадастра.

Для этого нами были изучены коллекции зоологических музеев: АН СССР (ЗИН), МГУ, АН УССР, КГУ, Львовского и Ужгородского университетов, Львовского и Харьковского природоведческих музеев, обработаны архивные материалы Республиканской СЭС, использованы литературные данные, а также устные сообщения зоологов о находках сонь на территории республики\*.

Полчок (*Glis glis*). Ареал полчка на Украине представлен одной из трех географических популяций, выделенных Г. Н. Лихачевым (1972) для СССР.

Значительно дополняют имеющиеся уже сведения новые находки полчка в Раховском, Иршавском, Воловецком, Перечинском районах и в окр. г. Ужгорода Закарпатской обл. Во Львовской обл. помимо указанных пунктов (окр. г.г. Львова, Жидачова, Сокаля, Броды) на основании новых находок мы можем выделить еще ряд точек — Сколевский, Городокский, Золочевский районы.

Кроме Долинского и Рожнятовского районов Ивано-Франковской обл., указанных Г. Н. Лихачевым (1972), мы имеем основания отметить находки полчка здесь в Верховинском, Надворнянском и Галичском районах (рис. 1).

Новыми данными по Волинской обл. мы не располагаем, однако кроме Сарн, можем отметить еще три точки в Ровенской обл. — Дубновский, Костопольский, Дубровицкий районы. По одной новой точке мы отмечаем для Черновицкой обл. (Новоселицкий р-н) и для Хмельницкой обл. (Сокирянский р-н).

Исследования последних лет не подтвердили находок полчка в Винницкой и на севере Одесской обл. Таким образом, предположения А. А. Мигулина (1938) и А. А. Браунера (1923) остаются не доказанными.

\* Автор выражает глубокую благодарность всем, кто оказал помощь в данной работе.



Рис. 1. Распространение полчка (*Glis glis*) на территории УССР: 1 — сведения из музеев, СЭС и собственные сборы; 2 — сведения из литературных источников; 3 — устные сообщения о находках сонь.

Садовая соня (*Eliomys quercinus*). В пределах СССР садовая соня остается наименее изученным видом. Этим, вероятно, объясняется и то, что Г. Н. Лихачев (1972) проводит южную границу ее ареала в европейской части СССР вне территории Украины. О находке этого вида 25.04.1965 г. в Уманском р-не Черкасской обл. Г. Н. Лихачев пишет лишь в сноске своей работы, не делая при этом никаких выводов\*. Тем не менее, находки садовой сони в Рокитновском р-не Ровенской обл. в 1965 и 1967 гг., в Вышгородском р-не Киевской обл. (Пуца-Водица под Киевом) 23.07.1976 г. и в Олевском р-не Житомирской обл. в июле 1986 г. существенно меняют сложившееся представление о южной границе ареала данного вида. Исследования, проводимые нами, пока не дали новых подтверждений наличия *Eliomys quercinus* в Уманском р-не Черкасской обл. Однако последняя находка кормящей самки с выводком в скворечнике на территории центральной усадьбы Полесского заповедника в июле 1986 г. дает нам основание однозначно утверждать, что садовая соня на Украине есть и южная граница ее ареала в пределах СССР проходит не по Белоруссии (Лихачев, 1972), а по Украине (рис. 2).

Орешниковая соня (*Muscardinus avellanarius*). Современные исследования подтвердили и дополнили указания Г. Н. Лихачева (1972) о широком распространении орешниковой сони в Закарпатье (Раховский, Хустский, Иршавский, Мукачевский, Ужгородский, Перечинский, Воловецкий районы). Во Львовской обл. сони обнаружены в трех точках Николаевского р-на. Сведениями о наличии сонь на севере Львовской обл. мы не располагаем.

В Ивано-Франковской обл. этот вид наиболее распространен в южных районах — Верховинский, Косовский, Коломыйский, Надворнянский.

\* В статье Г. Н. Лихачева (1972) допущена опечатка в указании точной даты отлова. Из текста ошибочно следует, что она была поймана 25.10.1965 г.

Рис. 2. Распространение садовой сони (*Eliomys quercinus*) на территории УССР (обозначения те же, что на рис. 1).

На западе обл. — в Долинском р-не, на востоке — в Тлумачском, на севере известна одна точка находки — в Рогатинском р-не (рис. 3).

В Волынской обл., кроме указаний Г. Н. Лихачева (1972), известна одна точка в Маневичском р-не. Здесь же, на Волыни, 22.05.1969 г. один экземпляр орешниковой сони был добыт В. И. Абеленцевым, но не указано точное место отлова. Г. Н. Лихачев (1972) включает всю Ровенскую обл. в список участков, где орешниковая соня не встречается.



Однако сведения о находках сонь в Дубровицком, Владимирецком, Сарненском, Рокитновском и Дубновском районах области и добыча автором этой статьи самки зверька 28.06.1988 г. в Костопольском р-не дают нам основание опровергнуть ранее изложенную точку зрения.

Сведениями о находках орешниковой сони в Тернопольской обл. мы не располагаем. В Черновицкой обл. этот вид известен из окр. с. Каменная Сторожинецкого р-на. В Хмельницкой обл. С. И. Огнев (1947) отмечает сонь в Каменец-Подольском р-не, Г. Н. Лихачев (1972) — в Дунаевецком, А. А. Мигулин (1938) — в окр. г. Хмельницкий. Мы располагаем новыми сведениями из Белогорского, Летичевского и еще одной точки Дунаевецкого р-на. Г. Н. Лихачев (1972) считает, что встречи орешниковой сони в южных частях этих областей носят единичный характер. Наши исследования показывают, что такое утверждение характерно не только для южных частей, а и практически для всей территории этих областей Украины.




Рис. 3. Распространение орешниковой сони (*Muscardinus avellanarius*) на территории УССР (обозначения те же, что на рис. 1).

В Житомирской обл., кроме уже известных (Новоград-Волынский, Любарский, Малинский, Овручский, Олевский районы), выделяется еще одна точка находки в Андрушевском р-не. В подтверждение прежних данных сони постоянно отмечаются в Олевском р-не — на территории Полесского заповедника (сообщение О. Яремченко). Автором статьи 29.06.1988 г. добыта самка орешниковой сони в окр. с. Ходурки Новоград-Волынского р-на.

Помимо указанных Г. Н. Лихачевым (1972) районов Винницкой обл. (Барский, Бершадский, Ильинецкий, Томашпольский, Тульчинский) сони также найдены в Хмельникском, Калиновском, Погребищенском, Литинском, Мур-Куриловецком, Ямпольском, Чечельникском районах и в окр. Винницы. Новыми находками подтверждены сведения из Ильинецкого и Барского районов. Можно утверждать, что орешниковая соня обычный для территории Винницкой обл. вид, успешно заселяющий все подходящие для существования биотопы.

Говоря о самой южной точке находки орешниковой сони в пределах Украины, очень важным представляется сообщение С. В. Тесленко. Находясь в экспедиции на севере Одесской обл. в 1983 г., он отметил большой процент заселенности *Muscardinus avellanarius* урочища Контроверсия близ г. Кодыма. Таким образом, становится подтвержденным указание А. А. Браунера (1923) о возможном обитании этого вида на севере Одесской обл.

Что касается правобережья Киевской и Черкасской областей, то здесь новыми находками подтверждены лишь известные уже указания о местах обитания орешниковой сони (около Умани, Городищенский, Звенигородский р-ны, в Каневском заповеднике, около Киева и в Чернобыльском р-не). Наоборот, новых данных, как и подтверждения прежних, о местах обитания сонь на левобережье Украины (юг Черниговской обл.) нет. Исключение составляют устные сообщения И. Р. Мерзликина и С. И. Золотухиной о двух точках в Сумской обл. — в Лебединском и Недригайловском районах. Сведения А. А. Мигулина (1938) и С. И. Огнева (1947) об орешниковой соне в районе Полтавы остаются не подтвержденными.

Лесная соня (*Dryomys nitedula*). Распространение лесной сони на территории Украины является продолжением ее обширного азиатского ареала и представляет собой его западный участок. В пределах республики этот вид наиболее широко распространен в ее восточных и центральных областях. На западе имеются два обособленных участка обитания, приуроченных к Карпатам на юге и к Волынской обл. на севере. На востоке регистрируются находки этого вида в Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и центральных районах Днепропетровской области (рис. 4).

В Луганской обл. наши исследования подтвердили наличие лесной сони в Свердловском, Краснодонском, Лутугинском, Новоайдарском, Кременском, Беловодском, Меловском, Сватовском районах. В Донецкой обл. — в Амвросиевском, Шахтерском р-нах, в окр. г. Торез, в Артемовском, Славянском, Краснолиманском районах.

Сведения об обитании зверька в Харьковской обл. сводились ранее к пяти районам — Изюмский, Змиевский, Валковский, Краснокутский и окр. г. Харькова. В настоящее время мы располагаем подтверждающими сведениями из всех этих районов, кроме Валковского, а также информацией из еще девяти районов области — Барвенковского, Боровского, Купянского, Велико-Бурлукского, Волчанского, Балаклеевского, Чугуевского, Дергачевского, Красноградского.

В Полтавской обл. лесные сони отмечались ранее в Карловском, Диканьском, Пирятинском районах и в окр. г. Полтавы. Сейчас нам известно еще ряд пунктов, где встречаются зверьки — это Новосанжарский, Кременчугский и Лубенский районы.

На территории Сумской обл. известно два района, где обитают лесные сони — это Краснопольский и Лебединский.




Рис. 4. Распространение лесной соны (*Dryomys nitedula*) на территории УССР (обозначения те же, что на рис. 1).

Собственными данными по Черниговской обл. мы не располагаем и отмечаем здесь ранее известные пункты в Городнянском и Нежинском районах, а также на границе Черниговской и Киевской областей — в Козелецком районе.

В Киевской обл. места обитания лесных сонь расположены в правобережной части, севернее г. Киева. Здесь они отмечаются в Чернобыльском, Бородянском, Вышгородском районах и в лесах, примыкающих к Киеву.

На северо-западе — в Житомирской обл., кроме известных точек в Малинском и Коростеньском районах, отмечены находки сонь в Олевском р-не на территории Полеского заповедника.

Южнее Киева по правобережью Днепра расположена довольно обширная зона обитания лесной соны, охватывающая значительную часть Черкасской и Кировоградской областей. В Черкасской обл. нашими исследованиями подтверждены указанные Г. Н. Лихачевым (1972) находки сонь в Каневском, Черкасском, Звенигородском, Уманском районах. Известные находки в Золотоношском, Корсунь-Шевченковском, Городищенском, Смелянском районах мы можем дополнить еще одной точкой в Христиновском р-не.

Г. Н. Лихачев (1972) включает Кировоградскую, запад Днепропетровской и всю Винницкую области в список южных и центральных регионов Украины, где «лесная соня не найдена». Однако, по нашим данным, этот вид широко распространен в Кировоградской обл. Здесь он многократно отмечен в Светловодском, Александрийском, Знаменском, Александровском, Новомиргородском, Маловисковском, Добровеличковском, Ульяновском районах. Имеющиеся данные по Днепропетровской обл. (Магдалиновский, Новомосковский, Днепропетровский, Верхнеднепровский районы) мы можем дополнить еще двумя точками находок: на востоке центральной части — Солонянский р-н, на западе — Пятихатский р-н.

Пластичность лесной соны в освоении новых биотопов подтверждается первыми ее находками в Винницкой обл. в 1983—1984 гг. Позже, в мае и в сентябре 1989 г. под Винницей и в районе г. Гайсина было отловлено в общей сложности еще 5 сонь. В данном случае мы можем говорить о продвижении участка ареала лесной соны в пределах центральных областей Украины с востока на запад.

В Одесской обл. лесную соню отмечали лишь в районе Балты (Лихачев, 1972). В 1989 г. экспедиция Института зоологии АН УССР обнаружила этот вид значительно южнее — в районе Фрунзовки.

Мы не располагаем сведениями о наличии лесной сони в западных районах Киевской обл., в центральных и южных районах Житомирской и на севере Винницкой областей. По прежнему «белыми пятнами» на карте для этого вида остаются Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская, Черновицкая области.

В западных областях Украины, как уже было сказано, выделяется два обособленных участка обитания лесной сони: на севере — Волынская, а на юге — Ивано-Франковская и Закарпатская области. Предположения С. И. Огнева (1947) о возможном обитании этого вида на Волыни подтвердились находками зверька в Любешовском, Маневичском и Киверцовском районах. В Ивано-Франковской обл. лесная соня наиболее характерна для центральных (Долинский, Тлумачский, Коломыйский) и южных районов — Косовский, Верховинский, окр. г. Яремча. В Закарпатской обл. зверек отмечен в Раховском р-не.

*Белик Л. И., Самарский С. Л., Новиков В. В.* Особенности размещения и динамика численности лесной сони и полчка на территории бассейна Среднего Днепра : Тез. докл. на III Всесоюз. конф. зоологов пед. ин-тов. — Витебск, 1984. С. 39—40.

*Белик Л. И.* Сони (Gliridae) как структурный элемент лесных биогеоценозов Среднего Приднпровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Днепропетровск, 1989 — С. 6—7.

*Браунер А. А.* Сельскохозяйственная зоология. — Харьков, 1923. — 50 с.

*Лихачев Г. Н.* Распространение сонь в Европейской части СССР // Фауна и экология грызунов. — М., 1972. — Вып. 11. — С. 71—110.

*Мигулин О. О.* Звірі УРСР. — К., 1938. — С. 241—251.

*Огнев С. И.* Звери СССР и прилежащих стран. Грызуны. Т. 5. — М., 1947. — С. 426—545.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена  
АН УССР (Киев)

Получено 16.05.90